

Tatuaggi , piercing, agopuntura (in ambiente non medico) contatti casuali con sangue o oggetti contaminati (ad es. siringhe)	4 mesi
Rapporti sessuali potenzialmente a rischio (con persone portatrici di epatite o AIDS, o sospette di esserlo- rapporti occasionali) :	4 mesi
Gastroscoopia , artroscopia, cistoscopia, colonscopia e tutte le altre indagini endoscopiche	4 mesi
Interventi chirurgici maggiori: interventi in cavità addominale e toracica, apparato muscolo-scheletrico (nel dubbio telefonare al Centro).	4 mesi
Interventi chirurgici minori: estrazione nevo, verruche, piccola chirurgia estetica (nel dubbio telefonare al Centro).	1 settimana
Fratture :	attendere la guarigione completa
Cure dentarie semplici otturazioni, detrartrasi, pulizia ontogenia	48 ore
Impianti dentari	1 mese dal termine
Estrazioni dentarie e devitalizzazioni	1 settimana
Farmaci	
antibiotici	7 gg,
cortisonici	15 gg;
anti-ipertensivi	occorre una attenta valutazione del tipo di farmaco usato e della gravità della malattia
antiinfiammatori, aspirina e altri :	valutare durata e motivo dell'assunzione.;
Viaggi all'estero : Inghilterra : soggiorno per più di 6 mesi nel periodo dal 1980 al 1996	sospensione definitiva
Paesi a rischio malarico:	sei mesi dopo il rientro
Paesi esotici – rischio igienico-sanitario	valutare caso per caso
Gravidanza :	1 anno dal parto
Aborto :	6 mesi
Vaccinazioni: Influenza, tetano, meningite, epatite A e B, rabbia	48 ore
Parotite, tifo, febbre gialla, morbillo, rosolia, varicella, botulino	1 mese